

GÜBRELEME PROGRAMLARI



www.fernabio.com



FerNaBio®
Fertilizer



**bitkilerde saėlık,
hasatta bereket**

www.fernabio.com

İÇİNDEKİLER

01 ARMUT

05 ELMA

09 HIYAR

13 NARENCİYE

17 ZEYTİN

21 TÜTÜN

25 ŞEKER
PANCARI

29 PATATES

33 MISIR &
YONCA

37 BUĞDAY
ARPA-YULAF

41 PATLİCAN

45 HAVUÇ

03 BAĞ

07 ÇİLEK

11 KIRAZ

15 ÜZÜMSÜ
MEYVELER

19 ÇELTİK

23 SOĞAN &
SARIMSAK

27 DOMATES

31 PAMUK

35 KAVUN &
KARPUZ

39 SİİRT-ANTEP
FISTIĞI

43 AYÇİÇEĞİ

47 BİBER

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

ARMUT



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	• Budamadan sonra uygulanır.	• Bitkiyi çiçek öncesi soğuğa karşı koruyup, kral çiçek oluşumunu garantiye almak için kullanılır.	• MICRO TOP Cu • PK GROW TOP	• 250 cc • 250 cc	• DUTCH MIX 13-35-5+TE • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 500 gr • 750 gr
	• Yeşil tomurcuk döneminde uygulanır.	• Homojen çiçek açımını sağlamak ve çiçeklenme periyodunu kısaltmak için kullanılır.	• CALMIX B • PK GROW TOP	• 250 cc • 150 cc	• DUTCH MIX 13-35-5+TE	• 1 kg
	• Tomurcukta yaprak uç gösterdiği dönemde uygulanır.	• Çiçekten meyve dönüşümünü sağlamak için kullanılır.	• MICRO TOP Cu • ASHLEY FERT PLUS • DYNA TOP MIX	• 250 cc • 100 cc • 100 gr	• EARTH COMPONENT • FERT N	• 500 cc • 500 cc
	• Tomurcuk ve yaprak tam görüldüğünde, çiçek öncesinde uygulanır.	• Çiçekten meyve dönüşümünü sağlamak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 100 gr	• EARTH COMPONENT	• 1 lt
	• Çiçeklenme başlangıcında uygulanır. Tomurcuk ve yaprak tam görüldüğünde, çiçek öncesinde uygulanır.	• Tutan meyvelerin sağlıklı olmasını sağlamak ve çatlamasını önlemek için kullanılır.	• FERT N • DYNA TOP MIX • ASHLEY FERT PLUS	• 250 cc • 100 gr • 100 cc	• CALMIX B • FERT N	• 1 lt • 500 cc
	• Çiçeklerin %30 açtığı dönemde uygulanır.	• Meyvelerin homojen kalibreli olmasını sağlamak ve çatlamasını önlemek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 100 gr	• CALMIX B • EARTH COMPONENT	• 500 cc • 500 cc
	• %100 çiçeklenmeden 4-5 gün sonraki dönemde uygulanır.	• İyi brix, homojen meyve, lezzet ve dayanıklılık elde etmek için kullanılır.	• FERT N • DYNA TOP MIX • ASHLEY FERT PLUS	• 150 cc • 100 gr • 100 cc	• DUTCH MIX 20-20-20+TE • CALMIX B	• 1 kg • 500 cc
	• Meyve bağlandıktan sonraki dönemde uygulanır. (Bitki durumuna göre 2 uygulama yapılabilir)	• Sağlıklı meyve büyümesi sağlamak, sıcaklık stresini azaltmak ve pas oluşumunu önlemek için kullanılır.	• CALMIX B • DYNA TOP MIX	• 250 cc • 150 gr	• DUTCH MIX 10-5-35+TE • CALMIX B • FERT N	• 1 kg • 500 cc • 500 cc

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

BAĞ



Detaylar >

ÇEKİRDEKLİ ÜZÜM (CRIMSON SEEDLES, RED GLOBE, ALFONS vb.)

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	• Salkım 3-4 cm boyunda olduğu dönemde uygulanır. (7 gün arayla 2 uygulama)	• Salkımı uzatmak ve mildiyöü önlemek için kullanılır.	• PK GROW TOP • MICRO TOP Cu • DUTCH MIX 13-35-5+TE	• 100 cc • 100 cc • 100 gr	• DUTCH MIX 13-35-5+TE • FERT N	• 750 gr • 500 cc
	• Petal yaprakların tamamen döküldüğü dönemde uygulanır.	• Salkımı uzatmak, seyreltme sağlamak ve kalan daneleri büyütmek için kullanılır.	• PK GROW TOP • ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B	• 100 cc • 100 cc • 150 cc	• CALMIX B • EARTH COMPONENT	• 500 cc • 500 cc
	• Dane büyüme döneminde uygulanır. (7 gün arayla 2 uygulama)	• Daneleri inleştirmek, sert pulpa ve yüksek kaliteli meyve sağlamak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 150 cc • 100 gr	• DUTCH MIX 20-20-20+TE • FERT N	• 750 gr • 250 cc
	• Renk dönüşüm döneminde uygulanır.	• Salkımda homojen renklenme, istenilen brix değeri ve sağlam doku oluşturmak, raf ömrünü uzatmak için kullanılır.	• K TOP PLUS • FERT N • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 150 cc • 100 cc • 100 gr	• DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 750 gr
	• Hasattan 25 gün önceki dönemde uygulanır.	• Homojen renklenme, sağlam doku oluşturmak ve raf ömrünü uzatmak için kullanılır.	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 200 cc • 100 gr	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 500 cc • 500 gr

ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM (SULTANİYE vb.)

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	• Salkım 3-4 cm boyunda olduğu dönemde uygulanır. (5 gün arayla 2 uygulama)	• Salkımı uzatmak ve homojen salkım gelişimi için kullanılır.	• MICRO TOP Cu • FERT N • DYNA TOP MIX	• 150 cc • 200 cc • 100 gr	• DUTCH MIX 13-35-5+TE • FERT N	• 750 gr • 500 cc
	• Çiçek döneminde uygulanır. (GA3 uygulama dönemi)	• Salkımı uzatmak ve sağlıklı döllenmeyi sağlamak için kullanılır.	• PK GROW TOP • ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B	• 100 cc • 100 cc • 100 cc	• CALMIX B • EARTH COMPONENT	• 500 cc • 500 cc
	• Petal yaprakların tamamen döküldüğü dönemde uygulanır. (7 gün arayla 2 uygulama)	• Salkımı uzatmak ve daneleri inleştirmek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B • DUTCH MIX 20-20-20+TE	• 100 cc • 150 cc • 100 gr	• DUTCH MIX 20-20-20+TE • FERT N	• 1 kg • 500 cc
	• Dane büyüme döneminde uygulanır. (2-3 uygulama)	• Homojen silktirme ve daneleri inleştirmek için kullanılır.	• K TOP PLUS • FERT N • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 150 cc • 100 cc • 100 gr	• DUTCH MIX 10-5-35+TE • CALMIX B	• 750 gr • 500 cc
	• Renk dönüşüm döneminde uygulanır.	• Şeker oranını artırmak, albenili daneli salkım oluşturmak ve raf ömrünü uzatmak için kullanılır.	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 150 cc • 100 gr	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 500 cc • 500 gr
	• Hasattan 25 gün önceki dönemde uygulanır.	• Yüksek şeker oranı, sağlam doku oluşturmak ve raf ömrünü uzatmak için kullanılır.	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 250 cc • 150 gr	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 750 cc • 750 gr

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

ELMA



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	Çiçekten önceki dönemde uygulanır.	Merkez çiçeğin erken açması ve ağacın sağlıklı gelişimi için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - PK GROW TOP	100 cc 250 cc	- FERT N - EARTH COMPONENT - DUTCH MIX 13-35-5+TE	250 cc 250 cc 500 gr
	1. uygulama %20 çiçek oluşumunda, 2. uygulama %80 çiçek oluşumunda uygulanır.	İyi meyve tutumu, homojen çiçek ve meyve için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DYNA TOP MIX	100 cc 200 gr	- FERT N - EARTH COMPONENT - DUTCH MIX 13-35-5+TE	500 cc 500 cc 1 kg
	Merkez çiçek artışı, taç yaprak (petal) dökümü, yıldızlanma döneminde uygulanır.	Hücre çoğalmasını hızlandırmak, meyve büyümesi ve merkez meyvenin kalibrasyon artışı için kullanılır.	- PK GROW TOP - CALMIX B - DYNA TOP MIX	100 cc 200 cc 100 gr	- CALMIX B - FERT N - DUTCH MIX 20-20-20+TE	250 cc 500 cc 1 kg
	Meyve iriliğinin 1-2 cm olduğu dönemde uygulanır.	Homojen meyve sağlamak ve daha sağlam doku için kullanılır. Acı benek, güneş yanığı ve pas lekelerine karşı önlem için kullanılır.	- MICRO TOP Cu - CALMIX B - ASHLEY FERT PLUS - FERT N	150 cc 200 cc 100 cc 100 cc	- CALMIX B - FERT N - DUTCH MIX 20-20-20+TE	250 cc 500 cc 1 kg
	Büyüme döneminde uygulanır. (7-10 gün arayla 2 uygulama)	Homojen meyve sağlamak ve daha sağlam doku için kullanılır. Acı benek, güneş yanığı ve pas lekelerine karşı önlem için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - K TOP PLUS - MICRO TOP Cu	100 cc 150 cc 150 cc	- CALMIX B - DUTCH MIX 10-5-35+TE	250 cc 1.5 kg
	Renk dönüşümünde uygulanır. (7 gün arayla 2 uygulama)	Kalibre, brix ve renklenme için kullanılır. Acı benek, güneş yanığı ve pas lekelerine karşı önlem için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - K TOP PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	100 cc 100 cc 100 cc 100 gr	- CALMIX B - DUTCH MIX 10-5-35+TE - K TOP PLUS	250 cc 1 kg 500 cc

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

ÇİLEK




Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	Şaşırtmadan sonraki dönemde uygulanır.	Çiçeklerin oluşumunu hızlandırmak ve çiçeklerin daha iyi gelişmesi için kullanılır.	- FERT N - DYNA TOP MIX - ASHLEY FERT PLUS	150 cc 100 gr 100 cc	- MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX - FERT N	250 cc 250 gr 500 cc
	Bitki büyüme döneminde uygulanır. (3-4 uygulama)	Güçlü ve dayanıklı bitki elde edebilmek için kullanılır.	- DYNA TOP MIX - ASHLEY FERT PLUS	100 gr 100 cc	- DYNA TOP MIX - DUTCH MIX 13-35-5+TE	250 gr 500 gr
	Uyanmadan sonra Mart-Nisan aylarında uygulanır. (10 günde 1 uygulama)	Çiçeklerin ve bitkinin iyi gelişebilmesi için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - PK GROW TOP	100 cc 200 cc	- DUTCH MIX 20-20-20+TE - CALMIX B	500 gr 250 cc
	Çiçek başlangıcında uygulanır. (Her çiçekte uygulanacak)	Meyve tutumu ve verimi artırmak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DYNA TOP MIX - DUTCH MIX 13-35-5+TE	100 cc 100 gr 150 gr	- DUTCH MIX 13-35-5+TE - FERT N - CALMIX B	500 gr 250 cc 250 cc
	Meyve büyüme döneminde uygulanır. (3-4 uygulama)	Meyveleri büyütmek, verimi artırmak; rengi, dokusu ve raf ömrü yüksek kaliteli ürün elde edebilmek için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - PK GROW TOP - K TOP PLUS - CALMIX B	100 cc 100 cc 100 cc 100 cc	- DUTCH MIX 10-5-35+TE - K TOP PLUS - CALMIX B	500 gr 250 cc 250 cc
	Her hasattan sonra uygulanır.	Verim ve kalite artışı sağlamak, hastalıklara karşı direnci yükseltmek, devamlı hasat için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - PK GROW TOP - DUTCH MIX 13-35-5+TE	100 cc 100 cc 150 gr	- MICRO TOP Cu - FERT N - DUTCH MIX 13-35-5+TE	100 cc 250 cc 500 gr

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

HIYAR



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	• Dikimden 1 hafta sonra uygulanır.	• Şaşırtmadan sonraki streslere karşı kullanılır. (Toprak, sıcaklık, sulama, fide vb.)	• ASHLEY FERT PLUS • MICRO TOP Cu • FERT N	• 100 cc • 100 cc • 200 cc	• MICRO TOP Cu • FERT N • EARTH COMPONENT	• 150 cc • 250 cc • 250 cc
	• Dikimden 15-20 gün sonra uygulanır.	• Çiçeklenmeyi artırmak, bitkinin yaprak ve sürgün çapını genişletmek ve bitkinin iz element ihtiyacını gidermek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • FERT N • DUTCH MIX Zn %35	• 100 cc • 200 cc • 25 gr	• EARTH COMPONENT • DUTCH MIX 13-35-5+TE • DUTCH MIX Zn %35	• 500 cc • 250 gr • 100 gr
	• Çiçeklenme döneminde uygulanır.	• Tozlanmayı (döl tutumunu) artırmak ve çiçek dökülmelerini önlemek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 200 cc • 150 gr	• CALMIX B • DUTCH MIX 13-35-5+TE • DYNA TOP MIX	• 500 cc • 750 gr • 100 gr
	• Hıyar büyüme başlangıcında uygulanır.	• Çiçek burnu çürüklüklerini ve streslerden dolayı meyve dökülmelerini önlemek, meyve büyümesini ve bitkinin topraktan besin alımını hızlandırmak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DUTCH MIX 20-20-20+TE • CALMIX B	• 100 cc • 200 gr • 150 cc	• FERT N • DUTCH MIX 20-20-20+TE	• 500 cc • 1 kg
	• Meyve büyüme döneminde uygulanır.	• Meyveyi hızlı büyütmek ve brix değerini yükseltmek için kullanılır.	• PK GROW TOP • FERT N • CALMIX B	• 200 cc • 100 cc • 200 cc	• FERT N • DUTCH MIX 10-5-35+TE • CALMIX B	• 250 cc • 750 gr • 250 cc
	• Hasat döneminde uygulanır.	• Bitkinin devamlılığını sağlamak ve tonaaj artırmak için kullanılır.	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 250 cc • 150 gr	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 500 cc • 250 gr
	• Bitkide aşın boylanma varsa uygulanır.		• PK GROW TOP • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 100 cc • 150 gr	• PK GROW TOP • DUTCH MIX 13-35-5+TE	• 750 cc • 250 gr
	• Yalancı mildiyö hastalığı varsa uygulanır.		• MICRO TOP Cu • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 150 gr	• MICRO TOP Cu • DUTCH MIX 13-35-5+TE • DYNA TOP MIX	• 250 cc • 500 gr • 150 gr
	• Kök çürüklüğü ve solgunluk varsa uygulanır.		• MICRO TOP Cu • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 150 gr	• MICRO TOP Cu • DUTCH MIX 20-20-20+TE • DYNA TOP MIX	• 250 cc • 500 gr • 150 gr
	• Boğum araları açılırsa uygulanır.		• PK GROW TOP • CALMIX B	• 200 cc • 150 cc	• CALMIX B • DYNA TOP MIX	• 750 cc • 250 gr
	• Tepe büyümesi durursa uygulanır.		• ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B • DYNA TOP MIX	• 150 cc • 100 cc • 100 gr	• CALMIX B • DUTCH MIX 13-35-5+TE • DUTCH MIX Zn %35	• 500 cc • 500 gr • 150 gr

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

KİRAZ



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	• Gözlerin şiştiği dönemde uygulanır.	• Bitkiyi çiçek öncesi soğuğa karşı koruyup, kral çiçek oluşumunu garantiye almak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • MICRO TOP Cu • PK GROW TOP • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 150 cc • 100 cc • 100 gr	• DUTCH MIX 13-35-5+TE • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 500 gr • 750 gr
	• Gözlerin patladığı beyaz tomurcuk ve pembe tomurcuk döneminde uygulanır.	• Homojen çiçek açımını sağlamak ve çiçeklenme periyodunu kısaltmak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B • PK GROW TOP	• 100 cc • 100 cc • 100 cc	• DUTCH MIX 13-35-5+TE	• 1 kg
	• Çiçeklenmenin %60-75 gerçekleştiği dönemde uygulanır.	• Çiçekten meyve dönüşümünü sağlamak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • MICRO TOP Cu • DUTCH MIX 13-35-5+TE	• 50 cc • 50 cc • 100 gr	-	-
	• Taç yapraklar (petal) dökümünde uygulanır.	• Çiçekten meyve dönüşümünü sağlamak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 200 cc • 100 gr	• EARTH COMPONENT • FERT N • DUTCH MIX 20-20-20+TE	• 500 cc • 500 cc • 750 gr
	• Meyvelerin 2-4 mm olduğu dönemde (iyileme dönemi) uygulanır. (1 hafta arayla 2 uygulama)	• Tutan meyvelerin iri olmasını sağlamak ve çatlamasını önlemek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • FERT N • CALMIX B	• 100 cc • 100 cc • 250 cc	• CALMIX B • FERT N • DUTCH MIX 20-20-20+TE	• 500 cc • 500 cc • 750 gr
	• Sarı benek döneminde uygulanır.	• Meyvelerin iri olmasını sağlamak ve çatlamasını önlemek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE • CALMIX B	• 100 cc • 100 gr • 200 cc	• CALMIX B • EARTH COMPONENT	• 500 cc • 500 cc
	• Kızarmanın olduğu dönemde uygulanır. (1 hafta arayla 2 uygulama)	• İyi brix, iri meyve, lezzet ve dayanıklılık elde etmek için kullanılır.	• FERT N • K TOP PLUS	• 100 cc • 200 cc	• CALMIX B • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 750 cc • 500 gr
	• Hasattan sonraki dönemde uygulanır. (1 hafta arayla 2 uyulama)	• Sağlıklı meyve büyümesi sağlamak, sıcaklık stresini azaltmak ve gözleri yeni sezona hazırlamak için kullanılır.	• MICRO TOP Cu • CALMIX B • DUTCH MIX Zn %35	• 350 cc • 150 cc • 100 gr	• CALMIX B • FERT N • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 500 cc • 250 cc • 750 gr
	• Yaprak dökümü başlayınca uygulanır.	• Meyve gözlerinin homojen oluşumunu ve beslenmesini sağlamak için kullanılır.	• MICRO TOP Cu • DYNA TOP MIX	• 250 cc • 150 gr	-	-

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

NARENCİYE



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	Don stresinden sonra, vejetasyon başlangıcındaki erken dönemde uygulanır. (1 hafta arayla 2 uygulama)	Yeni sürgün ve sürgünlerin iyi gelişmesi için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DYNA TOP MIX - MICRO TOP Cu	100 cc 150 gr 200 cc	- EARTH COMPONENT - DUTCH MIX 13-35-5+TE	750 cc 500 gr
	Çiçekten önceki dönemde uygulanır.	Bitkiyi çiçeğe hazırlamak için kullanılır.	- PK GROW TOP - DYNA TOP MIX - DUTCH MIX 13-35-5+TE	100 cc 100 gr 100 gr	- FERT N - DUTCH MIX 13-35-5+TE	500 cc 500 gr
	Çiçeklenme döneminde uygulanır. (Mandalina çeşitlerinde %20 ve %80 çiçekte 2 uygulama), (Limon ve Portakalda %50 çiçekte 1 uygulama)	Homojen ve sağlıklı döllenme için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - PK GROW TOP - DUTCH MIX 13-35-5+TE	100 cc 100 cc 50 gr	-	-
	Petal yaprakların dökülmeye başladığı dönemde uygulanır.	Hücre çoğalmasını hızlandırmak ve erken dökümü önlemek için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - CALMIX B - PK GROW TOP	50 cc 200 cc 150 cc	- FERT N - DUTCH MIX 20-20-20+TE	500 cc 750 gr
	Meyve büyüme döneminde uygulanır. (2-3 uygulama)	Meyve büyümesini hızlandırmak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - CALMIX B - DYNA TOP MIX	100 cc 200 cc 150 gr	- FERT N - DUTCH MIX 10-5-35+TE	250 cc 750 gr
	Renk dönüşümü döneminden önce uygulanır.	İyi brix, iri meyve, lezzet, sağlam doku ve kabuk elde etmek için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - CALMIX B - DUTCH MIX 10-5-35+TE	100 cc 200 cc 200 gr	- FERT N - DUTCH MIX 10-5-35+TE - DUTCH MIX 20-20-20+TE	250 cc 750 gr 750 gr
	Renk dönüşümü döneminde uygulanır.	Yüksek kalite, lezzet, sağlam doku ve raf ömrü elde etmek için kullanılır.	- K TOP PLUS - FERT N - CALMIX B	250 cc 150 cc 100 cc	- K TOP PLUS - DUTCH MIX 10-5-35+TE	500 cc 750 gr

ÜZÜMSÜ MEYVELER

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	• Şaşırtma yapıldıktan sonra uygulanır.	• Çelik kalitesini artırmak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • FERT N • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 100 cc • 100 gr	• MICRO TOP Cu • FERT N	• 250 cc • 500 cc
	• Çiçek öncesi dönemde uygulanır.	• Sağlıklı ve homojen çiçek oluşumu için kullanılır.	• FERT N • DUTCH MIX 13-35-5 • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 100 gr • 100 gr	• FERT N • DUTCH MIX 13-35-5+TE • DYNA TOP MIX	• 250 cc • 750 gr • 250 gr
	• Kardeşlenme döneminde uygulanır.	• Kardeşlenme artışı için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 100 gr	• DUTCH MIX 13-35-5+TE • DYNA TOP MIX	• 500 gr • 250 gr
	• Meyve olgunlaşma döneminde uygulanır.	• Kalibre artışı için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • PK GROW TOP	• 100 cc • 250 cc	• CALMIX B • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 500 cc • 750 gr
	• Renk dönüşümünde uygulanır. (7 gün arayla 2 uygulama)	• İyi brix, iri meyve, lezzet ve dayanıklılık elde etmek için kullanılır.	• K TOP PLUS • CALMIX B	• 200 cc • 150 cc	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 500 cc • 750 gr

YAPRAK GÜBRELEME PROGRAMI

ZEYTİN



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (100 litre suya)
	Gözler uyanmadan 20 gün önceki dönemde uygulanır.	Meyve tutumu ve halkalı lekeyi önlemek için kullanılır.	- MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX - ASHLEY FERT PLUS	250 cc 150 gr 100 cc
	Sürgün başlangıç döneminde uygulanır.	Uniform meyve yapısı sağlamak ve iz element taksviyesi için kullanılır.	- FERT N - CALMIX B - ASHLEY FERT PLUS - DUTCH MIX 20-20-20+TE	250 cc 250 cc 100 cc 150 gr
	Çiçeklenme döneminde uygulanır.	Meyvelerin uniform büyümesi ve sağlıklı meyve tutumu için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DUTCH MIX 13-35-5+TE - DUTCH MIX Zn %35 - MICRO TOP Cu	100 cc 150 gr 100 gr 100 cc
	Meyve bağlandıktan sonra uygulanır.	Yeni sürgünlerin iyi gelişmesi ve meyveyi büyütmek için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - PK GROW TOP - FERT N	100 cc 150 cc 250 cc
	Büyüme döneminde uygulanır.	Sıcaklık stresini azaltmak ve meyve büyümesinin devamını sağlamak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DUTCH MIX 10-5-35+TE - PK GROW TOP	100 cc 150 gr 250 cc
	Renk oluşum döneminde uygulanır.	Homojen meyve gelişimi, erken olgunlaştırma ve oluşabilecek soğuk stresine karşı korumak için kullanılır.	- K TOP PLUS - PK GROW TOP	250 cc 100 cc

GÜBRELEME PROGRAMI

ÇELTİK



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 Dekar)
	Tohum kaplama döneminde uygulanır.	Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	25 cc/ton 25 cc/ton 25 gr/ton
	Çıkış sonrası, kardeşlenme öncesi dönemde uygulanır. (Ot ilacıyla birlikte)	Homojen kardeşlenme, verimli çıkışlar için kullanılır.	- FERT N - EARTH COMPONENT	250 cc 200 cc
	Kardeşlenme döneminde uygulanır.	Sağlıklı ve homojen büyüme için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DUTCH MIX 13-35-5+TE - MICRO TOP Cu	100 cc 100 gr 100 cc
	Gebelenme döneminde uygulanır. (Kök boğaz ilacıyla birlikte)	Başak oluşumunun sağlıklı ve homojen olması için kullanılır.	- FERT N - DUTCH MIX Zn %35 - MICRO TOP Cu	250 cc 25 gr 100 cc
	Başak döneminde uygulanır.	Başaktaki kavuz içi dolununun daha sıkı olması, yüksek randıman ve sağlıklı olgunlaşması için kullanılır.	- K TOP PLUS - ASHLEY FERT PLUS	250 cc 100 cc

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

TÜTÜN



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	Tohum kaplama / daldırma döneminde uygulanır.	Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	25 cc 25 cc 25 gr	-	-
	Fidelik döneminde uygulanır.	Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - FERT N - DYNA TOP MIX	100 cc 100 cc 100 gr	-	-
	Şaşırtmadan sonraki dönemde uygulanır. (3-4 yaprak dönemi)	Büyümeyi hızlandırmak, bitkinin stres ve hastalıkları karşı direncini artırmak için kullanılır.	- FERT N - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	100 cc 100 cc 100 gr	- FERT N - EARTH COMPONENT	250 cc 500 cc
	8-9 yaprak döneminde uygulanır. (10 gün arayla 2 uygulama)	Verimi, kaliteyi ve tonajı artırmak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - PK GROW TOP	100 cc 100 cc	- FERT N - K TOP PLUS	250 cc 350 cc

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

SOĞAN & SARIMSAK



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (1 dekar)	Ürün	Dozaj (1 dekar)
	Tohum kaplama döneminde uygulanır.	Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	25 cc 25 cc 25 gr	-	-
	Dikim zamanı döneminde uygulanır.	Köklenmenin gelişmesi, bitkinin kuvvetlenmesi ve topraktaki tuzluluğun azaltılması için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	100 cc 100 cc 100 gr	- EARTH COMPONENT - FERT N - MICRO TOP Cu	500 cc 250 cc 100 cc
	Dikimden 30-35 gün sonraki dönemde uygulanır.	Döllenmenin artırılıp verim artışı sağlamak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DYNA TOP MIX - CALMIX B	100 cc 100 gr 250 cc	- EARTH COMPONENT - FERT N - MICRO TOP Cu	500 cc 250 cc 100 cc
	Kelleye dönme sürecindeki dönemde uygulanır. (Mantar ilaçlarıyla birlikte)	Verim artışı, ürün kalitesi sağlamak ve hastalıkları karşı direnç kazanmak için kullanılır.	- PK GROW TOP - CALMIX B - FERT N	250 cc 200 cc 100 cc	- DUTCH MIX 20-20-20+TE - CALMIX B - FERT N	1 kg 250 cc 250 cc
	Kelle döneminde uygulanır. (2 uygulama)	Homojen, sağlıklı ve ağır ürün sağlamak için kullanılır.	- PK GROW TOP - CALMIX B - K TOP PLUS	100 cc 200 cc 250 cc	- DUTCH MIX 10-5-35+TE - CALMIX B - FERT N	1 kg 250 cc 250 cc
	Hasattan 15-20 gün önceki dönemde uygulanır.	Kaliteli ürünler ve yüksek tonaj sağlamak için kullanılır.	- K TOP PLUS - FERT N - CALMIX B	250 cc 200 cc 100 cc	- DUTCH MIX 10-5-35+TE - K TOP PLUS	500 gr 500 cc

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

ŞEKER PANCARI



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (1 dekar)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	Tohum kaplama döneminde uygulanır.	Tohumların iyi çıkış yapabilmesi için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	25 cc 25 cc 25 gr	-	-
	Tohum ekimi sonrası dönemde uygulanır.	Atılan tohumların homojen filizlenmesi için ve taban gübresinin az kullanıldığı dönemlerde kötü hava şartlarına karşı koruma sağlamak için kullanılır.	- FERT N - DYNA TOP MIX	250 cc 100 gr	-	-
	3-4 yaprak döneminde uygulanır.	Güçlü bitki ve homojen yaprak sağlığı için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	100 cc 100 cc 100 gr	- EARTH COMPONENT - FERT N	750 cc 250 cc
	6-7 yaprak döneminde uygulanır. (10-15 gün arayla 3 uygulama)	Sağlıklı yaprak ve kök oluşumu için kullanılır.	- FERT N - ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu	250 cc 100 cc 100 cc	- DUTCH MIX 20-20-20+TE - CALMIX B	500 gr 250 cc
	Son dönemde sıra aralan kapanmadan uygulanır. (Hasattan 1 ay önce 1 hafta arayla 2 uygulama)	Daha iri meyve, kalite, tat ve raf ömrünü artırmak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - K TOP PLUS	100 cc 250 cc	- DUTCH MIX 10-5-35+TE - CALMIX B - FERT N	500 gr 250 cc 250 cc

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

DOMATES

SANA YİLİK & SOFRALIK




Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 litre suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	• Dikimden 1 hafta sonra uygulanır.	• Şaşırtmadan sonraki streslere karşı kullanılır. (Toprak, sıcaklık, sulama, fide vb.)	• ASHLEY FERT PLUS • MICRO TOP Cu • FERT N	• 100 cc • 100 cc • 200 cc	• MICRO TOP Cu • FERT N • EARTH COMPONENT	• 150 cc • 250 cc • 250 cc
	• Çiçeklenmeden hemen önceki dönemde uygulanır.	• Çiçeklenmeyi artırmak, bitkinin yaprak ve sürgün çapını genişletmek ve bitkinin iz element ihtiyacını gidermek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DUTCH MIX 13-35-5+TE • DUTCH MIX Zn %35	• 100 cc • 200 gr • 25 gr	• EARTH COMPONENT • DUTCH MIX 13-35-5+TE • DUTCH MIX Zn %35	• 500 cc • 250 gr • 100 gr
	• Çiçeklenme döneminde uygulanır.	• Tozlanmayı (döl tutumunu) artırmak ve çiçek dökülmelerini önlemek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 200 cc • 150 gr	• Çiçek meyve döneminde su kesilir.	• Çiçek meyve döneminde su kesilir.
	• Tozlaşma (döllenme) döneminden sonra uygulanır.	• Çiçek bumu çürüklüklerini ve streslerden dolayı meyve dökülmelerini önlemek, meyve büyümesini ve bitkinin topraktan besin alımını hızlandırmak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DUTCH MIX 20-20-20+TE • CALMIX B	• 100 cc • 200 gr • 150 cc	• FERT N • DUTCH MIX 20-20-20+TE	• 500 cc • 1 kg
	• Meyve büyüme (inileşme) döneminde uygulanır.	• Meyveyi hızlı büyütmek ve brix değerini yükseltmek için kullanılır.	• PK GROW TOP • FERT N • CALMIX B	• 200 cc • 100 cc • 200 cc	• FERT N • DUTCH MIX 10-5-35+TE • CALMIX B	• 250 cc • 1 kg • 250 cc
	• Sulamayı kestikten sonraki dönemde uygulanır. (Hasattan 20-25 gün önce)	• Meyveyi homojen olgunlaştırmak ve erken hasat için kullanılır.	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 250 cc • 150 gr	• K TOP PLUS • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 500 cc • 500 gr

YAPRAK GÜBRELEME PROGRAMI

PATATES



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 dekara - Holder veya Yağmurlama ile)
	Tohum kaplama döneminde uygulanır.	Homojen ve sağlıklı çıkış için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	75 cc 75 cc 75 gr
	İlk stolonlar görülmeden önce uygulanır.	Oluşacak stolonların homojenliğinin ve verim artışının alt yapısının sağlanması için kullanılır.	- FERT N - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	200 cc 150 cc 200 gr
	Stolonları atma döneminde uygulanır.	Stolonların verim artışının sağlanması için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DUTCH MIX 13-35-5+TE - CALMIX-B	150 cc 200 gr 100 c
	Stolonlarının uç yumruları 1 - 1,5 cm iken uygulanır.	Stolonların ucunda teşekkül eden yumruların hücre sayısını artırmak ve yumru kalibresinin alt yapısını sağlamak için kullanılır.	- FERT N - DUTCH MIX 13-35-5+TE - CALMIX-B	200 cc 150 gr 100 cc
	Stolonların uç yumruları 2,5 - 3,5 cm iken uygulanır.	Stolonların ucunda teşekkül eden yumru kalibresini ve homojenliğini sağlamak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DUTCH MIX 10-5-35+TE - CALMIX-B	150 cc 150 gr 100 cc
	Stolonlarının uç yumruları 4,5 - 5,5 cm iken uygulanır.	Yumru kalibresini ve homojenliğini sağlamak için kullanılır.	- K TOP PLUS - DUTCH MIX 10-5-35+TE - CALMIX-B	250 cc 150 gr 200 cc

YAPRAK GÜBRELEME PROGRAMI

PAMUK



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 Dekar)
	Tohum kaplama döneminde uygulanır.	Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	5 cc/torba 5 cc/torba 5 gr/torba
	2-4 yaprak döneminde uygulanır.	Homojen taraklanma ve sağlıklı bitki çatısı oluşturmak için kullanılır.	- EARTH COMPONENT - ASHLEY FERT PLUS - FERT N	100 cc 100 cc 50 cc
	Taraklanma başlangıcındaki dönemde uygulanır. (%30-%50 taraklanma)	Tarak dökümünü engellemek için ve koza kütlü pamuk ağırlığını artırmak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DUTCH MIX 13-35-5+TE - CALMIX B	100 cc 50 gr 50 cc
	Çiçek dökümünden sonraki dönemde uygulanır.	Lif kalitesi ve mukavetini sağlamak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DUTCH MIX 20-20-20+TE - CALMIX B	150 cc 50 gr 50 cc
	Koza başlamadan önceki dönemde uygulanır.	Sağlıklı taraklanma ve homojen koza açımı için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	150 cc 150 cc 100 gr
	Kozaların açıldığı dönemde uygulanır.	Yüksek kalitede koza ve lif elde etmek için kullanılır.	- CALMIX B - FERT N - DUTCH MIX 10-5-35+TE	100 cc 100 cc 100 gr
	Tüm kozaların açılacağı dönemde uygulanır. (7 gün arayla 2-3 uygulama)	Koza kütlü (çiğitli) pamuk ağırlığını artırmak ve tamamen açılmayan kozaların açılmasını teşvik etmek için kullanılır.	- K TOP PLUS - FERT N	100 cc 100 cc

GÜBRELEME PROGRAMI

MISIR & YONCA



Detaylar >

MISIR	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 dekar)
	Tohum kaplama döneminde uygulanır.	Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	5 cc/torba 5 cc/torba 5 gr/torba
	4-6 yaprak döneminde uygulanır. (Ot ilacı dönemi)	Dalgali çıkışlarda tarladaki homojenlik ve koçan çevresinin iyi kodlanması için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - FERT N - DYNA TOP MIX	100 cc 250 cc 150 gr
	8-10 yaprak döneminde uygulanır.	Koçan boyunun kodlanması, tane sayısı artışı ve homojen tane doluluğu için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - FERT N - DUTCH MIX 13-35-5+TE	100 cc 250 cc 150 gr

YONCA	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 dekar)
	Biçimden ve sulamadan 13-18 gün sonraki filizlenme döneminde, yeni sürgün yapraklar 1-2 cm boyunda iken uygulanır.	Biçim zamanını erkene almak ve hızlı büyütmek için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - FERT N - DYNA TOP MIX	100 cc 250 cc 150 gr

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

KAVUN & KARPUZ



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (1 dekara)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	Can suyuyla birlikte uygulanır.	Bitkinin iyi kök ve sağlam gövde oluşumunu teşvik etmek için kullanılır.	-	-	- MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX - FERT N	150 cc 200 gr 250 cc
	Dikimden 7-10 gün sonraki dönemde uygulanır. (1 hafta arayla 2 uygulama)	Bitkinin iyi kök ve sağlam gövde oluşumunu teşvik etmek için kullanılır.	- MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX - FERT N	100 cc 100 gr 150 cc	- MICRO TOP Cu - CALMIX B - FERT N	100 cc 250 cc 500 cc
	Çiçekten öncesi erken dönemde uygulanır.	Homojen dağılımlı daha fazla çiçek elde etmek için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DYNA TOP MIX	100 cc 150 gr	- FERT N - DUTCH MIX 20.20.20+TE	250 cc 500 gr
	Çiçeklenme başlangıç döneminde uygulanır.	İyi meyve gelişimi sağlamak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DYNA TOP MIX - MICRO TOP Cu	100 cc 100 gr 150 cc	- EARTH COMPONENT - DUTCH MIX 13-35-5+TE	500 cc 750 gr
	Meyve tutumundan sonraki dönemde uygulanır. (7-10 gün arayla 3 uygulama)	Kaliteli, büyük, şeker oranı yüksek ürün elde etmek ve raf ömrünü artırmak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - PK GROW TOP - CALMIX B	100 cc 150 cc 250 cc	- EARTH COMPONENT - DUTCH MIX 20-20-20+TE	250 cc 750 gr
	Hasattan önceki dönemde uygulanır. (10 gün arayla 2 uygulama yapılır, sonraki dönemde hasat yapılana kadar daha iyi olgunlaşma için su azaltılır.)	Kaliteli, büyük, şeker oranı yüksek, daha canlı renklerde ürün elde etmek ve raf ömrünü artırmak için kullanılır.	- K TOP PLUS - CALMIX B - FERT N	250 cc 150 cc 100 cc	- K TOP PLUS - DUTCH MIX 10-5-35+TE - FERT N	500 cc 750 gr 250 cc

BUĞDAY & ARPA & YULAF

GÜBRELEME PROGRAMI



Detaylar >

BUĞDAY	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 dekar)
	• Tohum kaplama döneminde uygulanır.	• Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • MICRO TOP Cu • DYNA TOP MIX	• 25 cc/ton • 25 cc/ton • 25 gr/ton
	• Çıkış sonrası, kardeşlenme öncesi dönemde uygulanır.	• Homojen kardeşlenme, verimli çıkışlar için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DUTCH MIX Zn %35	• 100 cc • 25 gr
	• Kök boğaz ilacı döneminde uygulanır.	• Başak oluşumunun sağlıklı ve homojen olması için kullanılır.	• FERT N • DUTCH MIX 13-35-5+TE • MICRO TOP Cu	• 250 cc • 100 gr • 100 cc
	• Ot ilacı döneminde uygulanır.	• Sağlıklı ve homojen büyüme için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DYNA TOP MIX • FERT N	• 100 cc • 100 gr • 150 cc
	• Pas ve süne ilacı döneminde uygulanır.	• Başaktaki kavuz içi dolumunun daha sıkı olması, protein miktarının artırılması ve sağlıklı olgunlaşması için kullanılır.	• K TOP PLUS • ASHLEY FERT PLUS	• 200 cc • 100 cc
ARPA & YULAF	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 dekar)
	• Tohum kaplama döneminde uygulanır.	• Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • MICRO TOP Cu • DYNA TOP MIX	• 25 cc/ton • 25 cc/ton • 25 gr/ton
	• Çıkış sonrası, kardeşlenme öncesi dönemde uygulanır.	• Homojen kardeşlenme, verimli çıkışlar için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DUTCH MIX Zn %35	• 100 cc • 25 gr
	• Kök boğaz ilacı döneminde uygulanır.	• Başak oluşumunun sağlıklı ve homojen olması için kullanılır.	• DUTCH MIX 13-35-5+TE • MICRO TOP Cu	• 100 gr • 100 cc
	• Ot ilacı döneminde uygulanır.	• Sağlıklı ve homojen büyüme için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DYNA TOP MIX • FERT N	• 100 cc • 100 gr • 150 cc
	• Pas ve süne ilacı döneminde uygulanır.	• Başaktaki kavuz içi dolumunun daha sıkı olması, protein miktarının artırılması ve sağlıklı olgunlaşması için kullanılır.	• K TOP PLUS • ASHLEY FERT PLUS	• 200 cc • 100 cc
MALTLIK ARPA	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 dekar)
	• Tohum kaplama döneminde uygulanır.	• Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • MICRO TOP Cu • DYNA TOP MIX	• 25 cc/ton • 25 cc/ton • 25 gr/ton
	• Çıkış sonrası, kardeşlenme öncesi dönemde uygulanır.	• Homojen kardeşlenme, verimli çıkışlar için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DUTCH MIX Zn %35	• 100 cc • 25 gr
	• Kök boğaz ilacı döneminde uygulanır.	• Başak oluşumunun sağlıklı ve homojen olması için kullanılır.	• MICRO TOP Cu • PK GROW TOP	• 100 cc • 50 cc
	• Ot ilacı döneminde uygulanır.	• Sağlıklı ve homojen büyüme için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 100 gr
	• Pas ve süne ilacı döneminde uygulanır.	• Başaktaki kavuz içi dolumunun daha sıkı olması ve sağlıklı olgunlaşması için kullanılır.	• K TOP PLUS • ASHLEY FERT PLUS	• 200 cc • 100 cc

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

SIIRT & ANTEP FISTIĞI



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABAN UYGULAMA	
			Ürün	Dozaj (100 lt suya)	Ürün	Dozaj (1 dekara)
	Hasat sonrasında uygulanır.	Sonraki yılın homojen göz oluşumu ve bitki sağlığı için kullanılır.	- CALMIX B - DYNA TOP MIX - MICRO TOP Cu	250 cc 100 gr 250 cc	-	-
	Uyanışa hazırlık döneminde uygulanır.	Sezonun homojen göz oluşumu ve bitki sağlığı için kullanılır.	-	-	EARTH COMPONENT	2,5 lt
	Çiçeklenme öncesi dönemde uygulanır.	Bitkiyi çiçek öncesi soğuğa karşı koruyup, homojen çiçek açımını sağlamak ve çiçeklenme periyodunu kısaltmak için kullanılır.	- PK GROW TOP - ASHLEY FERT PLUS - DUTCH MIX 13-35-5+TE	250 cc 100 cc 150 gr	- FERT N - DUTCH MIX 13-35-5+TE	500 cc 1 kg
	Çiçeklenme sonrası dönemde uygulanır.	Meyvelerin iri olmasını sağlamak ve yüksek kalitede meyve elde etmek için kullanılır.	- CALMIX B - PK GROW TOP - DUTCH MIX 20-20-20+TE	200 cc 100 cc 200 gr	- FERT N - DUTCH MIX 20-20-20+TE - EARTH COMPONENT	250 cc 1 kg 250 cc
	Meyve tutumu sonrası, Alternaria (Karazenk) döneminde uygulanır.	Sağlıklı ve yüksek rekolteli ürün sağlamak için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - CALMIX B	100 cc 200 cc 150 cc	- DUTCH MIX 10-5-35+TE - FERT N	1 kg 250 cc
	Hasattan 1 ay önceki dönemde uygulanır. (10 gün arayla 2 uygulama)	Çatlak ürün miktarını artırmak ve yüksek tonaj elde etmek için kullanılır.	- K TOP PLUS - FERT N - DUTCH MIX 10-5-35+TE	250 cc 100 cc 100 gr	- K TOP PLUS - DUTCH MIX 10-5-35+TE	500 cc 1 kg

YAPRAK & TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

PATLİCAN



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABAN UYGULAMA	
			Ürün	1 Dekara / 100 lt suya	Ürün	Dozaj (1 dekar)
	• Dikimden 7-10 gün sonraki dönemde uygulanır.	• Fidenin hızlı gelişimi ve iz element ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • MICRO TOP Cu • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 100 cc • 100 gr	• FERT N • DYNA TOP MIX • MICRO TOP Cu	• 250 cc • 250 gr • 250 cc
	• Çiçekten önceki dönemde uygulanır.	• Sağlıklı çiçeklenme sağlamak ve bitki çatısını oluşturmak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DUTCH MIX 13-35-5+TE • DUTCH MIX Zn %35	• 50 cc • 200 gr • 25 gr	• EARTH COMPONENT • DUTCH MIX 13-35-5+TE • FERT N	• 500 cc • 250 gr • 250 cc
	• Çiçeklenme döneminde uygulanır.	• Döl tutumunu artırmak, homojen meyve tutumu sağlamak ve çiçek dökümünü önlemek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • PK GROW TOP	• 100 cc • 150 cc	• DUTCH MIX 13-35-5+TE • FERT N	• 500 gr • 250 cc
	• Döllenmeden sonraki dönemde uygulanır.	• Erken yanıklığı önlemek ve meyve kalitesini artırmak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DYNA TOP MIX • CALMIX B	• 100 cc • 100 gr • 250 cc	• FERT N • DUTCH MIX 20-20-20+TE	• 500 cc • 1 kg
	• Meyve döneminde uygulanır.	• Meyve büyümesini hızlandırmak ve kaliteli meyve sağlamak için kullanılır.	• PK GROW TOP • DYNA TOP MIX • CALMIX B	• 150 cc • 100 gr • 150 cc	• FERT N • DUTCH MIX 10-5-35+TE • CALMIX B	• 250 cc • 1 kg • 250 cc
	• Meyve tutumundan 7-10 gün sonraki dönemde uygulanır.	• Meyveyi homojen olgunlaştırmak ve dolgunluk değerini yükseltmek için kullanılır.	• PK GROW TOP • K TOP PLUS • CALMIX B	• 250 cc • 250 cc • 150 cc	• FERT N • DUTCH MIX 10-5-35+TE • CALMIX B	• 250 cc • 750 gr • 250 cc

YAPRAK VE TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

AYÇİÇEĞİ - GÜNEBAKAN



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 Dekar)
	Tohum kaplama döneminde uygulanır.	Sağlıklı ve homojen çıkış için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - MICRO TOP Cu - DYNA TOP MIX	5 cc/torba 5 cc/torba 5 gr/torba
	4-6 yaprak döneminde uygulanır. (Geniş yaprak ot ilacı dönemi)	Dalgali çıkışlarda tarladaki homojenlik ve sağlıklı tabla oluşumu için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - FERT N - DYNA TOP MIX	100 cc 250 cc 150 gr
	8-12 yaprak döneminde uygulanır. (Dar yaprak ot ilacı dönemi)	İstenen tabla oluşumu, danelerde sağlıklı süt olumu ve homojen dane doluluğu için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - PK GROW TOP - MICRO TOP Cu	100 cc 250 cc 150 cc

YAPRAK VE TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

HAVUÇ



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	Ürün	Yapraktan Uygulama Dozajı (1 Dekar)
	Dikimden 7 gün sonraki dönemde uygulanır. (10 gün arayla 2 uygulama)	Ağır bünyeli topraklarda havucun uzaması ve sağlıklı, homojen bitki yapısı için kullanılır.	- ASHLEY FERT PLUS - DYNA TOP MIX - FERT N	100 cc 100 gr 250 cc
	Bitki büyüme döneminde uygulanır. (7 gün arayla 2 uygulama)	Yüksek verim sağlamak, ürün kalitesini artırmak için kullanılır.	- PK GROW TOP - DYNA TOP MIX - CALMIX B	150 cc 200 gr 200 cc
	Hasattan 15-20 gün önceki dönemde uygulanır. (7 gün arayla 2 uygulama)	İstenilen kalibre ve renk kalitesi sağlamak, brix değerini yükseltmek ve raf ömrünü uzatmak için kullanılır.	- DUTCH MIX 10-5-35+TE - K TOP PLUS - CALMIX B	100 gr 250 cc 150 cc

YAPRAK VE TABAN GÜBRELEME PROGRAMI

BİBER



Detaylar >

Görsel	Dönem	Amaç	YAPRAKTAN UYGULAMA		TABANDAN UYGULAMA	
			Ürün	1 Dekara / 100 lt suya	Ürün	Dozaj (1 dekar)
	• Dikimden 7-10 gün sonraki dönemde uygulanır.	• Fidenin hızlı gelişimi, iz element ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşabilecek fungal, virütik durumlara karşı direnç sağlamak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • MICRO TOP Cu • DYNA TOP MIX	• 100 cc • 100 cc • 100 gr	• FERT N DYNA TOP MIX • MICRO TOP Cu DUTCH • MIX 13-35-5+TE •	• 250 cc • 100 gr • 250 cc • 250 gr
	• Çiçekten önceki dönemde uygulanır.	• Sağlıklı çiçeklenme sağlamak ve bitki çapını (yaprak ve sürgün) genişletmek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DUTCH MIX 13-35-5+TE • DUTCH MIX Zn %35	• 50 cc • 200 gr • 25 gr	• EARTH COMPONENT • DUTCH MIX 13-35-5+TE • FERT N	• 500 cc • 250 gr • 250 cc
	• Çiçekten önceki dönemde uygulanır.	• Bitkiyi boylandırmak için kullanılır.	• 24 saat boş su, 12 saat bekleme süresi, 24 saat boş su, 12 saat bekleme süresi, 12 saat boş su			
	• Çiçeklenme döneminde uygulanır.	• Döl tutumunu artırmak, homojen meyve tutumu sağlamak ve çiçek dökümünü önlemek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • PK GROW TOP	• 100 cc • 150 cc	• DUTCH MIX 13-35-5+TE • FERT N	• 500 gr • 250 cc
	• Döllenmeden sonraki dönemde uygulanır.	• Çiçek burnu çürüklüklerini önlemek ve meyve kalitesini artırmak için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • DYNA TOP MIX • CALMIX B	• 100 cc • 100 gr • 250 cc	• FERT N • DUTCH MIX 20-20-20+TE	• 500 cc • 1 kg
	• Renk dönüşümü döneminden önce uygulanır.	• İyi brix, iri meyve, lezzet, sağlam doku ve kabuk elde etmek için kullanılır.	• ASHLEY FERT PLUS • CALMIX B • DUTCH MIX 10-5-35+TE	• 100 cc • 200 cc • 200 gr	• FERT N • DUTCH MIX 10-5-35+TE • DUTCH MIX 20-20-20+TE	• 250 cc • 750 gr • 750 gr
	• Meyve tutumundan 7-10 gün sonraki dönemde uygulanır.	• Meyveyi homojen olgunlaştırmak ve brix değerini yükseltmek için kullanılır.	• PK GROW TOP • K TOP PLUS • CALMIX B	• 250 cc • 250 cc • 150 cc	• FERT N • DUTCH MIX 10-5-35+TE • CALMIX B	• 250 cc • 750 gr • 250 cc

İLETİŞİM

E-mail info@fernabio.com
Website www.fernabio.com
Telefon +90 312 240 90 40
Adres Prof. Dr. Ahmet Taner
Kışlalı Mah. 2782. Sk. No:5
Çankaya-Ankara/TÜRKİYE



fernabiofertilizer



fernabiofertilizer



fernabiofertilizer



FerNaBio[®]
Fertilizer

www.fernabio.com